

2015年4月22日

ファイザー株式会社
「男女比較:長く続く痛みに関する実態調査2015」
参考資料

- I. 調査設計
- II. 調査結果のまとめ

I. 調査設計

1. 調査の目的

痛みは難治化する前に、適切な診療が行われることが重要だが、多くの人が痛みを抱えながらも我慢したり、自己判断で通院を中断している現状があるとされている。今回は、長く続く痛みを抱える人の意識・対処法の実態を探るとともに、コミュニケーション行動やその背景にある考え方を男女を軸に比較して検証する。

2. 調査の内容

◇調査対象： 長く続く痛み※を抱える全国の20歳以上の男女9400人(男女各4700人)

※長く続く痛みの定義：「週2回以上の頻度で痛みが起こる」、「1ヵ月以上痛みが続いている」、「疼痛の11段階(0:全く痛みはない、10:想像を絶する最悪の痛み)のスケールで1以上の強さの痛み」の全てに該当するもの

◇調査方法： インターネットアンケート調査

3. 調査の実施日


2015年3月27日(金)～2015年3月31日(火)

注：本資料中の数値は、全て少数点第2位以下を四捨五入しています。

Ⅱ. 調査結果


【SC1】あなたの性別をお答えください。(SA)

n=全回答者 9,400回答




【SC2】現在の婚姻状況について、あてはまるものをお選びください。(SA)

n=全回答者 9,400回答



【SC3】あなたは現在、「長く続く痛み」をもっていますか。「ない」場合は「(0)全く痛みは感じない」をお選びください。
 「ある」場合は、痛みの程度としてお考えに近い選択肢を1つ選んでお知らせください。(SA)
 ※長く続く痛みが、複数の場所、病気・症状に関わる場合は、総合的にみた痛みとしてお考えください。


n=全回答者 9,400回答



【SC4】あなたの「長く続く痛み」は、どのくらい前から続いている痛みになりますか。(SA)

※長く続く痛みが、複数の場所、病気・症状に関わる場合は、総合的にみた痛みとしてお考えください。


n=全回答者 9,400回答



【SC5】あなたの「長く続く痛み」は、どのくらいの「頻度」で痛みますか。(SA)



※長く続く痛みが、複数の場所、病気・症状に関わる場合は、総合的にみた痛みとしてお考えください。

n=全回答者 9,400回答




【SC6】あなたの現在の長く続く痛みは、体のどの部位になりますか。その長く続く痛みを感じている体の場所をすべてお選びください。(MA)

n=全回答者 9,400回答



【SC7】あなたの長く続く痛みは、具体的にどのような痛みですか。下記のうち、あなたの痛みの症状に近い表現の選択肢を1つずつお選びください。(SA)


n=全回答者 9,400回答



※ある計は、「少しある」+「ある」+「強くある」+「非常に強くある」の合計値


【Q1】あなたが抱える「長く続く痛み」についてお伺いします。痛みが長く続いたとき、初めにとる対処法をお選びください。
(SA)

n=全回答者 9,400回答



【Q2】あなたが抱える「長く続く痛み」についてお伺いします。以下の痛みへの対処方法について、痛みを感じ始めてから、どのタイミングで行うことが多いですか。(SA)


n=全回答者 9,400回答




【Q2】あなたが抱える「長く続く痛み」についてお伺いします。以下の痛みへの対処方法について、痛みを感じ始めてから、どのタイミングで行うことが多いですか。(SA)

n=全回答者 9,400回答

【何もしない(我慢する)】




【痛み止めを飲む】




【Q2】あなたが抱える「長く続く痛み」についてお伺いします。以下の痛みへの対処方法について、痛みを感じ始めてから、どのタイミングで行うことが多いですか。(SA)

n=全回答者 9,400回答

【塗り薬・貼り薬を使用する】




【家族に相談する】




【Q2】あなたが抱える「長く続く痛み」についてお伺いします。以下の痛みへの対処方法について、痛みを感じ始めてから、どのタイミングで行うことが多いですか。(SA)

n=全回答者 9,400回答

【友人に相談する】




【病院に行く】




【Q2】あなたが抱える「長く続く痛み」についてお伺いします。以下の痛みへの対処方法について、痛みを感じ始めてから、どのタイミングで行うことが多いですか。(SA)

n=全回答者 9,400回答

【マッサージに行く】





【接骨院・整骨院に行く】



【Q2】あなたが抱える「長く続く痛み」についてお伺いします。以下の痛みへの対処方法について、痛みを感じ始めてから、どのタイミングで行うことが多いですか。(SA)


n=全回答者 9,400回答

◆「痛みを感じて24時間以内」の割合



【Q3】あなたは、長く続く痛みのためにどの程度の頻度で痛み止めを服用しますか。(SA)


n=全回答者 9,400回答




【Q3】あなたは、長く続く痛みのためにどの程度の頻度で痛み止めを服用しますか。(SA)

n=全回答者 9,400回答

【市販の痛み止め】




【病院で処方された痛み止め】



【Q4】痛み止めに関する下記の内容についてどのようにお考えになりますか。あてはまるものをお選びください。(SA)

n=全回答者 9,400回答




※TOP2計の値は、「とてもそう思う」+「そう思う」の合計値


【Q4】痛み止めに関する下記の内容についてどのようにお考えになりますか。あてはまるものをお選びください。(SA)

n=全回答者 9,400回答

【痛み止めは飲み続けると効かなくなるのでなるべく飲まない方が良い】



【痛み止めは我慢できなくなったときに飲むものだ】




※TOP2計の値は、「とともそう思う」+「そう思う」の合計値


【Q4】痛み止めに関する下記の内容についてどのようにお考えになりますか。あてはまるものをお選びください。(SA)

n=全回答者 9,400回答

【痛み止めを使うと病気の治りが遅くなる】




【痛み止めは胃が荒れるのでなるべく飲まない方が良い】



※TOP2計の値は、「とてもそう思う」+「そう思う」の合計値



【Q5】あなたは、今まで(5年以内)に「長く続く痛み」で病院・医院に通院したことがありますか。(SA)

n=全回答者 9,400回答





【Q6】あなたが、今まで(5年以内)に「病院・医院での痛みの治療」で通院した診療科をすべてお知らせください。(MA)

n=Q5「通院したことはない」以外の回答者 5,957回答





【Q7】あなたが抱える「長く続く痛み」の治療のために、あなたが病院に行ったきっかけは以下の内どれですか。
最もあてはまるものをお知らせください。(SA)

n=Q5「通院したことはない」以外の回答者 5,957回答




【Q8】あなたが今まで「痛みの治療」で病院に行かなかった理由をすべてお知らせください。(MA)

n=Q5「通院したことはない」回答者 3,443回答



【Q9】あなたが病院・医院で診療を受けている、もしくは受けていた「長く続く痛み」の治療についてあなたのお考えをそれぞれお選びください。(SA)

n=Q5「通院したことはない」以外の回答者 5,957回答




※TOP2計の値は、「はい」+「どちらかといえばはい」の合計値


【Q9】あなたが病院・医院で診療を受けている、もしくは受けていた「長く続く痛み」の治療についてあなたのお考えをそれぞれお選びください。(SA)

n=Q5「通院したことはない」以外の回答者 5,957回答

【受けている(受けていた)治療に満足していますか】



【医師との対話は十分ですか(でしたか)】




※TOP2計の値は、「はい」+「どちらかといえばはい」の合計値


【Q9】あなたが病院・医院で診療を受けている、もしくは受けていた「長く続く痛み」の治療についてあなたのお考えをそれぞれお選びください。(SA)

n=Q5「通院したことはない」以外の回答者 5,957回答

【医師に十分症状を伝えられていますか(いましたか)】



【医師は親身になってくれている(なってくれていた)と思いますか】




※TOP2計の値は、「はい」+「どちらかといえばはい」の合計値

【Q9】あなたが病院・医院で診療を受けている、もしくは受けていた「長く続く痛み」の治療についてあなたのお考えをそれぞれお選びください。(SA)

n=Q5「通院したことはない」以外の回答者 5,957回答


【医師と治療目標を確認しましたか】



※TOP2計の値は、「はい」+「どちらかといえばはい」の合計値

【Q10】あなたが病院・医院で診療を受けている、もしくは受けていた「長く続く痛み」の治療の際に、以下の選択肢の中から最もあてはまるものを一つお選びください。(SA)


n=Q9-5.医師と治療目標を確認しましたか:「はい」「どちらかといえばはい」回答者 3,506回答




【Q10】あなたが病院・医院で診療を受けている、もしくは受けていた「長く続く痛み」の治療の際に、以下の選択肢の中から最もあてはまるものを一つお選びください。(SA)

n=Q9-5.医師と治療目標を確認しましたか:「はい」「どちらかといえばはい」回答者 3,506回答

【医師と確認した治療目標(治療のゴール)】




【あなた自身が治療目標(治療のゴール)としていること】



【Q11】痛みについて以下の人からの情報を得た場合、その情報についてどの程度重視しますか。(SA)

n=全回答者 9,400回答




※TOP2計の値は、「とも重視する」+「重視する」の合計値


【Q11】痛みについて以下の人からの情報を得た場合、その情報についてどの程度重視しますか。(SA)

n=全回答者 9,400回答

【通院先の医師の指示】



【著名な医師の意見】




※TOP2計の値は、「とても重視する」+「重視する」の合計値


【Q11】痛みについて以下の人からの情報を得た場合、その情報についてどの程度重視しますか。(SA)

n=全回答者 9,400回答

【友人の勧め】



【家族の勧め】




※TOP2計の値は、「とても重視する」+「重視する」の合計値


【Q11】痛みについて以下の人からの情報を得た場合、その情報についてどの程度重視しますか。(SA)

n=全回答者 9,400回答

【他人の経験談】





【マッサージや鍼灸師・整骨院の先生の指示】



※TOP2計の値は、「とても重視する」+「重視する」の合計値


【Q12】あなたが抱える長く続く痛みがなくなった場合、何がしたいですか。最もあてはまるものを一つお知らせください。
(SA)

n=全回答者 9,400回答




【Q13】あなたが抱えている「長く続く痛み」について、下記の人には伝えていますか。それぞれ選んでください。(SA)

n=全回答者 9,400回答




n=Q13 痛みを誰かに伝えている人 8,193回答



【Q14】あなたが「長く続く痛み」を抱えていることを、周りの人に伝えるのはなぜですか。(MA)


n=Q13 痛みを誰かに伝えている人 8,193回答



		(n)	自身の痛みのせいで迷惑をかける可能性があるから	話すことで自分が安心するから	日常生活に支障があることを理解してもらいたいから	痛みの辛さを分かかってほしいから	痛みを和らげる方法を知りたいから	家事や仕事などの負担を軽減してほしいから	心配してほしいから	これら以外の理由
全体		(8,193人)	32.9% (2,692人)	30.2% (2,471人)	26.8% (2,192人)	16.5% (1,349人)	15.2% (1,249人)	7.2% (590人)	5.1% (415人)	20.4% (1,670人)
性別	男性	(3,943人)	34.6% (1,365人)	23.8% (938人)	23.3% (918人)	13.9% (547人)	12.7% (500人)	4.6% (181人)	5.8% (227人)	21.9% (865人)
	女性	(4,250人)	31.2% (1,327人)	36.1% (1,533人)	30.0% (1,274人)	18.9% (802人)	17.6% (749人)	9.6% (409人)	4.4% (188人)	18.9% (805人)

【Q15】自分が痛みを感じているときに以下の行動をパートナーにやってほしいと思いますか。もっともあてはまることを選択肢を次の中からそれぞれ1つお選びください。(SA)

n=SC2「未婚・恋人なし」以外の回答者 7,095回答





※TOP2計の値は、「とてもそう思う」+「そう思う」の合計値

【Q15】自分が痛みを感じているときに以下の行動をパートナーにやってほしいと思いますか。もっともあてはまることを選択肢を次の中からそれぞれ1つお選びください。(SA)

n=SC2「未婚・恋人なし」以外の回答者 7,095回答


◆TOP2計の割合



※TOP2計の値は、「とてもそう思う」+「そう思う」の合計値

【Q16】もしパートナーが「長く続く痛み」を抱えていたとします。パートナーから痛みについて相談された場合、どのように感じますか。最もあてはまることをお選びください。(SA)

n=SC2「未婚・恋人なし」以外の回答者 7,095回答





※TOP2計の値は、「とてもそう思う」+「そう思う」の合計値

【Q16】もしパートナーが「長く続く痛み」を抱えていたとします。パートナーから痛みについて相談された場合、どのように感じますか。最もあてはまることをお選びください。(SA)

n=SC2「未婚・恋人なし」以外の回答者 7,095回答


◆TOP2計の割合



※TOP2計の値は、「とてもそう思う」+「そう思う」の合計値


【Q17】もしパートナーが「長く続く痛み」を抱えていたとします。パートナーに対してどのような対応をとりますか。
最もあてはまることをお選びください。(SA)

n=SC2「未婚・恋人なし」以外の回答者 7,095回答



【Q18】あなたは周囲の人から以下の内容の相談を受けることがよくありますか。(SA)

n=全回答者 9,400回答




※TOP2計の値は、「よくある」+「たまにある」の合計値


【Q18】あなたは周囲の人から以下の内容の相談を受けることがよくありますか。(SA)

n=全回答者 9,400回答

【仕事上の問題】



【家庭内の問題】




※TOP2計の値は、「よくある」+「たまにある」の合計値


【Q18】あなたは周囲の人から以下の内容の相談を受けることがよくありますか。(SA)

n=全回答者 9,400回答

【健康上の問題】




【人間関係の問題】



※TOP2計の値は、「よくある」+「たまにある」の合計値

【Q19】あなたは周囲の人に体の不調や痛みについて相談されたことがありますか。(SA)

n=全回答者 9,400回答




※TOP2計の値は、「よくある」+「たまにある」の合計値


【Q19】あなたは周囲の人に体の不調や痛みについて相談されたことがありますか。(SA)

n=全回答者 9,400回答

【異性から相談されること】



【同姓から相談されること】




※TOP2計の値は、「よくある」+「たまにある」の合計値


【Q20】周囲の人に体の不調や痛みについて相談された場合にどのように感じますか。(MA)
 また、あなたが感じるもののうち、最もそう思うと思うことを選んでください。(SA)

n=Q18「全くない」以外の回答者 7,336回答

<異性から相談された場合に感じること>



※上段: 異性から相談された場合に感じること(MA)、下段: そのうち、もっとも「そう思う」と思うこと(SA)




※上段: 異性から相談された場合に感じること(MA)、下段: そのうち、もっとも「そう思う」と思うこと(SA)


【Q20】周囲の人に体の不調や痛みについて相談された場合にどのように感じますか。(MA)
 また、あなたが感じるもののうち、最もそう思うと思うことを選んでください。(SA)

n=Q18「全くない」以外の回答者 7,336回答

<同姓から相談された場合に感じること>



※上段：同姓から相談された場合に感じること(MA)、下段：そのうち、もっとも「そう思う」と思うこと(SA)




※上段：同姓から相談された場合に感じること(MA)、下段：そのうち、もっとも「そう思う」と思うこと(SA)


【Q21】周囲の人に体の不調や痛みについて相談された場合、相手にどのようなことをしてあげたいと思いますか。(MA) また、あなたがしてあげたいことのうち、最もそう思うと思うことをお選びください。(SA)

n=全回答者 9,400回答

<異性から相談された場合にしてあげたいこと>



※上段: 異性から相談された場合にしてあげたいこと(MA)、下段: そのうち、もっとも「そう思う」と思うこと(SA)




※上段: 異性から相談された場合にしてあげたいこと(MA)、下段: そのうち、もっとも「そう思う」と思うこと(SA)


【Q21】周囲の人に体の不調や痛みについて相談された場合、相手にどのようなことをしてあげたいと思いますか。(MA) また、あなたがしてあげたいことのうち、最もそう思うと思うことをお選びください。(SA)

n=全回答者 9,400回答

<同姓から相談された場合にしてあげたいこと>




※上段：同姓から相談された場合にしてあげたいこと(MA)、下段：そのうち、もっとも「そう思う」と思うこと(SA)



※上段：同姓から相談された場合にしてあげたいこと(MA)、下段：そのうち、もっとも「そう思う」と思うこと(SA)

【Q22】体の不調や痛みを相談されたときにしてあげたいと思ったことは、実際に行っていますか。(SA)

n=各Q21の回答者




※TOP2計の値は、「毎回やっている」+「時々やっている」の合計値


【Q22】体の不調や痛みを相談されたときにしてあげたいと思ったことは、実際に行っていますか。(SA)

n=各Q21の回答者

【そっとしておく】



【具合を聞く】




※TOP2計の値は、「毎回やっている」+「時々やっている」の合計値


【Q22】体の不調や痛みを相談されたときにしてあげたいと思ったことは、実際に行っていますか。(SA)

n=各Q21の回答者

【病院に行くように言う】



【身体を休めるように声をかける】




※TOP2計の値は、「毎回やっている」+「時々やっている」の合計値


【Q22】体の不調や痛みを相談されたときにしてあげたいと思ったことは、実際に行っていますか。(SA)

n=各Q21の回答者

【体調や痛みを改善するお勧めの方法をアドバイスする】




【できないこと(家事などの用事)を代わりにやってあげる】



※TOP2計の値は、「毎回やっている」+「時々やっている」の合計値

【Q23】あなたは周囲の人が体の不調や痛みを抱えていることを察することができる方だと思いますか。(SA)


n=全回答者 9,400回答



※TOP2計の値は、「よく気が付く」+「たまに気付く」の合計値

【Q24】あなたの周りでも痛みを抱える人がいるとします。その人が異性だった場合、以下のような行動についてどのように感じますか。(SA)

n=全回答者 9,400回答




※TOP2計の値は、「とても好ましい」+「好ましい」の合計値


【Q24】あなたの周りでも痛みを抱える人がいるとします。その人が異性だった場合、以下のような行動についてどのように感じますか。(SA)

n=全回答者 9,400回答

【痛いことを訴える】



【言葉では言わないが、態度で痛みがあることを訴える】




※TOP2計の値は、「とても好ましい」+「好ましい」の合計値

【Q24】あなたの周りでも痛みを抱える人がいるとします。その人が異性だった場合、以下のような行動についてどのように感じますか。(SA)

n=全回答者 9,400回答


【痛くても我慢している】



※TOP2計の値は、「とても好ましい」+「好ましい」の合計値

【Q25】あなたの周りでも痛みを抱える人がいるとします。その人が同性だった場合、以下のような行動についてどのように感じますか。(SA)

n=全回答者 9,400回答




※TOP2計の値は、「とても好ましい」+「好ましい」の合計値


【Q25】あなたの周りでも痛みを抱える人がいるとします。その人が同性だった場合、以下のような行動についてどのように感じますか。(SA)

n=全回答者 9,400回答

【痛いことを訴える】



【言葉では言わないが、態度で痛みがあることを訴える】




※TOP2計の値は、「とても好ましい」+「好ましい」の合計値

【Q25】あなたの周りでも痛みを抱える人がいるとします。その人が同性だった場合、以下のような行動についてどのように感じますか。(SA)

n=全回答者 9,400回答


【痛くても我慢している】



※TOP2計の値は、「とても好ましい」+「好ましい」の合計値

【Q26】あなたは、以下の意見に対してどのように考えますか。あてはまるものをお選びください。(SA)

n=全回答者 9,400回答




※TOP2計の値は、「とてもそう思う」+「そう思う」の合計値


【Q26】あなたは、以下の意見に対してどのように考えますか。あてはまるものをお選びください。(SA)

n=全回答者 9,400回答

【女性の方が男性に比べて痛みが強いと思う】



【男性の方が女性に比べて痛みが強いと思う】




※TOP2計の値は、「とてもそう思う」+「そう思う」の合計値


【Q26】あなたは、以下の意見に対してどのように考えますか。あてはまるものをお選びください。(SA)

n=全回答者 9,400回答

【「痛い」という事を、簡単に他人に言うべきではないと思う】



【痛みがあっても我慢している人を、強い人だと思う】




※TOP2計の値は、「とてもそう思う」+「そう思う」の合計値


【Q26】あなたは、以下の意見に対してどのように考えますか。あてはまるものをお選びください。(SA)

n=全回答者 9,400回答

【痛みがあってもある程度、自分も我慢するべきだと思う】




【他人に頻繁に痛みを訴える人を感情的な人だと思う】



※TOP2計の値は、「とてもそう思う」+「そう思う」の合計値

【Q27】あなたは、「痛み」について、下記の内容をご存知ですか。(SA)

n=全回答者 9,400回答




※TOP2計の値は、「よく知っている」+「聞いたことがある」の合計値


【Q27】あなたは、「痛み」について、下記の内容をご存知ですか。(SA)

n=全回答者 9,400回答

【痛みには「種類」があること】




【長く続く痛みの対処法】



※TOP2計の値は、「よく知っている」+「聞いたことがある」の合計値

【Q28】あなたは、「痛みの種類」について、下記の内容をご存知ですか。(SA)

n=全回答者 9,400回答




※TOP2計の値は、「よく知っている」+「聞いたことがある」の合計値


【Q28】あなたは、「痛みの種類」について、下記の内容をご存知ですか。(SA)

n=全回答者 9,400回答

【「痛み」の種類として、「炎症などを要因とする」痛み＝「侵害受容性の痛み」があること】



【「痛み」の種類として、「神経が要因による」痛み＝「神経障害性の痛み」があること】




※TOP2計の値は、「よく知っている」+「聞いたことがある」の合計値

【Q28】あなたは、「痛みの種類」について、下記の内容をご存知ですか。(SA)

n=全回答者 9,400回答

【「痛み」の種類として、「炎症などを要因とする」痛みと「神経が要因による」痛みが混合した痛み＝「混合性の痛み」があること】




		(n)	よく知っている	聞いたことがある	知らない	TOP2計
全体		(9,400人)	17.6% (1,659人)	49.1% (4,617人)	33.2% (3,124人)	66.8% (6,276人)
神経障害性疼痛有無	疑いあり	(1,865人)	27.6% (514人)	46.8% (872人)	25.7% (479人)	74.3% (1,386人)
	疑いなし	(7,535人)	15.2% (1,145人)	49.7% (3,745人)	35.1% (2,645人)	64.9% (4,890人)

※TOP2計の値は、「よく知っている」+「聞いたことがある」の合計値

【Q29】あなたは、「痛みの治療」について、下記の内容をご存知ですか。(SA)

n=全回答者 9,400回答




※TOP2計の値は、「よく知っている」+「聞いたことがある」の合計値


【Q29】あなたは、「痛みの治療」について、下記の内容をご存知ですか。(SA)

n=全回答者 9,400回答

【「痛み」の専門診療科として「ペインクリニック」という診療科があること】



【「神経障害性の痛み」に対する治療法のひとつとして飲み薬があること】




※TOP2計の値は、「よく知っている」+「聞いたことがある」の合計値


【Q29】あなたは、「痛みの治療」について、下記の内容をご存知ですか。(SA)

n=全回答者 9,400回答

【「神経障害性の痛み」に対する治療法の一つとして神経ブロックという療法があること】



【「神経障害性の痛み」には消炎鎮痛剤(一般的な痛み止め)が効かないということ】



※TOP2計の値は、「よく知っている」+「聞いたことがある」の合計値

